

# 带状疱疹ワクチンのご案内(要予約)

50歳を過ぎたら带状疱疹の予防接種ができます

## 带状疱疹とは

体の片側の一部にピリピリとした痛みがあらわれ、その部分に赤い発疹が出てきます。痛みは徐々に増していき、夜も眠れないほど激しい場合もあります。  
皮膚の症状が治った後も、痛みが残ることがあり、3ヶ月以上痛みが続くこともあります。



## 带状疱疹のワクチン

### ① 水痘ワクチン (ビケン)

これまでは水ぼうそうの予防にも使われているワクチン

### ② シングリックス

シングリックスは2ヶ月間隔で筋肉内に2回接種



	① 带状疱疹予防 (ビケン)	② 带状疱疹予防 (シングリックス)
ワクチンの種類	生ワクチン	不活化ワクチン
接種回数	1回	2回 (2ヶ月後に2回目) 遅くとも6ヶ月後までに接種
予防効果	50~60%	90%以上
持続期間	5年程度	9年以上
副反応	接種部位の痛み 腫れ、発赤、発熱 3日~1週間で消失	接種部位の痛み、腫れ、 発赤、筋肉痛、全身倦怠感、頭痛 3日~1週間で消失
料金	8,000円 (税込)	22,000円×2回 合計44,000円 (税込)
長所	・1回で済む ・料金が安い	・免疫が低下している方にも接種できる ・予防効果が高い ・持続期間が長い
短所	・持続期間が短い ・免疫低下の方に接種できない	・痛みがある ・2回接種が必要 ・料金が高い
うってはいけない方	・妊娠していることが明らかな方 ・免疫力を抑える治療をしている方 ・一部の抗生剤にアレルギーがある方 (生ワクチンのため対象者が多い)	・アナフィラキシーのある方 ・明らかな発熱や急性疾患の方 (不活化ワクチンなので生ワクチンより対象者が少ない)



辛い後遺症を残さないためにも  
お気軽にスタッフまでお声かけください

